

Lettre d'information

numéro 14, Mars 2020

Retrouvez-nous également sur
SoEpidemio le blog de notre équipe
 ouvert à toutes les contributions



L'Equipe de recherche en épidémiologie sociale (ERES) constitue l'une des huit équipes de l'Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et Santé Publique (UMRS 1136) labellisées par l'Inserm et Sorbonne Universités. Nos travaux portent sur l'étude des inégalités sociales et territoriales de santé et la recherche des déterminants sociaux de la santé et des recours aux soins, notamment les facteurs biographiques, les insertions sociales, les origines migratoires et l'environnement géographique.

Santé périnatale

Activité physique durant la grossesse et dépression post-partum

Domain-specific physical activity and sedentary behavior during pregnancy and postpartum depression risk in the French EDEN and ELFE cohorts.

Van der Waerden J, Nakamura A, Salla J, Pryor L, El-Khoury F, Dargent-Molina P, Charles MA. *Preventive medicine* 2019; 121:33-39



La relation entre position socio-économique et poids et taille des enfants à la naissance

Which modifiable prenatal factors mediate the relation between socioeconomic position and a child's weight and length at birth?

Ballon M, Botton J, Forhan A, de Lauzon-Guillain B, Melchior M, El Khoury F, Nakamura A, Charles MA, Lioret S, Heude B. *Maternal & Child Nutrition* 2019; e12878. doi: 10.1111/mcn.12878.

Mauvaises conditions de croissance foetale en fonction du niveau socio-économique du quartier

Adverse Birth Outcomes as Indicators of Poor Fetal Growth Conditions in a French Newborn Population-A Stratified Analysis by Neighborhood Deprivation Level

Kihal-Talantikite W, Le Nouveau P, Legendre P, Zmirou Navier D, Danzon A, Carayol M, Deguen S. *Int J Environ Res Public Health* 2019. Nov; 16(21): 4069. doi: 10.3390/ijerph16214069

Santé mentale des enfants et adolescents

L'isolement social de l'enfant augmente le risque de désordre psychotique du jeune adulte

Childhood Social Isolation and Psychotic Experiences in Young Adulthood: A Community Based Study.

Bennett J, Moulton L, Surkan P, Fombonne E, Melchior M

European Child & Adolescent Psychiatry 2019; doi.org/10.1007/s00787-01.

La fréquentation d'une crèche est associée à moins de comportements perturbateurs à l'adolescence

Early childhood child care and disruptive behavior problems during adolescence: a 17-year population-based propensity score study.

Orri M, Tremblay RE, Japel C, Boivin M, Vitaro F, Losier T, Brendgen MR, Falissard B, Melchior M, Côté SM.

Journal of Child Psychology and Psychiatry 2019; 60(11): 1174–1182



Environnement psychosocial au travail et risque de troubles dépressifs

Psychosocial working conditions and depressive disorder: disentangling effects of job control from socioeconomic status using a life-course approach.

Svane-Petersen AC, Holm A, Burr H, Framke E, Melchior M, Rod NH, Sivertsen B, Stansfeld S, Sørensen JK, Virtanen M, Rugulies R, Madsen IEH. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2019; : doi: 10.1007/s00127-019-0

La transmission intergénérationnelle de problèmes de santé mentale

Is children's mental illness "a family affair"?

Melchior M.

European Child & Adolescent Psychiatry 2019; 28(7): 875–876.

Les problèmes de développement neurologique à 2 ans selon le statut migratoire maternel


Maternal immigrant status and signs of neurodevelopmental problems in early childhood – The French representative ELFE birth cohort.

Schmengler H, El-Khoury Lesueur F, Yermachenko A, Taine M, Cohen D, Peyre H, Saint-Georges C, Thierry X, Melchior M.
Journal of the International Society for Autism research 2019; 12(12): 1845-1859.

Instabilité financière durant l'enfance associée à un niveau élevé de symptômes psychosociaux à l'adolescence

Trajectories of family poverty and children's mental health: Results from the Danish National Birth Cohort.

Pryor L, Strandberg-Larsen K, Nybo Andersen AM, Hulvej Rod N, Melchior M.
Soc Sci Med 2019; 220: 371-378.



Appréhender le défi de la prise en charge d'un enfant souffrant de TSA

Vécus de parents et d'enseignants de la prise en charge des enfants souffrant de troubles du spectre autistique

Chastang J, Lindivat A, Delmestre J, Soares A, Kapassi A, Avenin G, Petitdemange S, Ibanez G.
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence 2019; 67(8): 383-390.

Santé des jeunes adultes précaires

Impact de consultations de médecine préventive et sociale sur la formation des jeunes non insérés

Effects of a systematically offered social and preventive medicine consultation on training and health attitudes of young people not in employment, education or training (NEETs): An interventional study in France.

Robert S, Romanello L, Lesieur S, Kerfoot V, Dutertre J, Ibanez G, Chauvin P.
PLoS One 2019; 14(4): e0216226.

Santé des migrants et des immigrés

Santé perçue des migrants vus par Médecins du Monde dans cinq pays européens

Self-Perceived Health among Migrants Seen in Médecins du Monde Free Clinics in Europe: Impact of Length of Stay and Wealth of Country of Origin on Migrants' Health.

Combes SJB, Simonnot N, Azzedine F, Aznague A, Chauvin P.
Int J Environ Res Public Health 2019; 16(24): 4878.




Prise en charge des migrants sub-sahariens après le diagnostic du VIH

Social and structural factors and engagement in HIV care of sub-Saharan African migrants diagnosed with HIV in the Paris region.

Vignier N, Desgrees Du Lou A, Pannetier J, Ravalihasy A, Gosselin A, Lert F, Lydie N, Bouchaud O, Dray Spira R, Chauvin P, PARCOURS Study Group.
AIDS Care 2019; 31(7): 897-907.

Cancer

Aspects contextuels de la non-participation des généralistes au dépistage du cancer du col de l'uterus



General practitioners who never perform Pap smear: the medical offer and the socio-economic context around their office could limit their involvement in cervical cancer screening.

Maj C, Poncet L, Panjo H, Gautier A, Chauvin P, Menvielle G, Cadot E, Ringa V, Rigal L.
BMC Family Practice 2019; 20: 114.

Cancer du sein et retour à l'emploi deux ans après le diagnostic

Impact of Breast Cancer Treatment on Employment: Results of a Multicenter Prospective Cohort Study (CANTO).

Dumas A, Vaz Luis I, Bovagnet T, El Mouhebb M, Di Meglio A, Pinto S, Charles C, Dauchy S, Delaloge S, Arveux P, Coutant C, Cottu P, Lesur A, Lerebours F, Tredan O, Vanlemmens L, Levy C, Lemonnier J, Mesleard C, Andre F, Menvielle G.
J Clin Oncol. 2019; Dec 13: doi:10.1200/JCO.19.01726.

Déterminants de la non-adhérence au dépistage du cancer du col chez les femmes obèses

The determinants of cervical cancer screening uptake in women with obesity: application of the Andersen's behavioral model to the CONSTANCES survey.

Franck JE, Ringa V, Cœuret-Pellicer M, Chauvin P, Menvielle G.
Cancer Causes Control 2019; Dec 3: doi: 10.1007/s10552-019-0

Hypertension

Contributions du mode de vie et de la situation socio-économique à la variation de la prévalence de l'hypertension en France

Geographical variations in the prevalence of hypertension in France: Cross-sectional analysis of the CONSTANCES cohort.

Neufcourt L, Deguen S, Bayat S, Paillard F, Zins M, Grimaud O.
Eur J Prev Cardiol. 2019 Aug;26(12):1242-1251. doi: 10.1177/2047487319842229.

Addictions

Une revue de la littérature sur les conséquences de la libéralisation du cannabis sur la consommation des jeunes
Does liberalisation of cannabis policy influence levels of use in adolescents and young adults? A systematic review and meta-analysis.

Melchior M, Nakamura A, Bolze C, Hausfater F, El Khoury-Lesueur F, Mary-Krause M, Azevedo Da Silva M.
BMJ Open 2019; 9:e02588. doi:10.1136/bmjopen-201.

Consommation de produits psychoactifs illégaux par les femmes et santé sexuelle et reproductive

Grossesses non prévues, violences sexuelles et contraception chez les femmes consommant du cannabis ou d'autres substances psychoactives illégales en Île-de-France : données du Baromètre Santé 2016.

Embersin-Kyprianou C, Yermachenko A, Massari V, El-Khoury-Lesueur F, Melchior M.
Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique 2020; 68(1): 9-15.

Associations entre symptômes dépressifs et usage de la cigarette électronique

Electronic cigarette use is associated with depressive symptoms among smokers and former smokers: cross-sectional and longitudinal findings from the Constances cohort.

Wiernik E, Airagnes G, Lequy E, Gomajee R, Melchior M, Le Faou AL, Limosin F, Goldberg M, Zins M, Lemogne C.
Addict Behav 2019; 90: 85-91.



Une étude qualitative du tabagisme chez les jeunes adultes

To smoke or not to smoke? A qualitative study among young adults.

Pourtal L, Martin E, Menvielle G, El Khoury-Lesueur F, Melchior M.
Preventive Medicine Reports 2019; 15: 100927.

Alimentation

Les normes alimentaires sont négociées à Santiago et rigides à Paris

Meal times and synchronization: A cross-metropolitan comparison between Santiago (Chile) and Paris (France).

Lhuissier A, Giacoman C, Ferrant C, Devilat D, Leal D, Ayala P, Torres G, Chauvin P.
Soc Sci J 2019; In Press.

